

EDH – Enuresis Diagnose Hilfe

Enuresis nocturna	Ja	Nein
Nässt Ihr Kind in der Nacht ein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alter > oder = 5 Jahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Warnzeichen

Falls die Antwort auf auch nur eine einzige der folgenden Fragen »Ja« ist, liegt möglicherweise keine simple »monosymptomatische Enuresis« vor und eine weiterführende Diagnostik ist unbedingt indiziert!

Urologische Symptome*	Ja	Nein
Harnverlust tagsüber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miktionsfrequenz/Tag 8x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miktionsfrequenz/Tag 3x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imperativer Harndrang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elterliches Drängen zur Miktion notwendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portionsweises Urinieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Begleiterkrankungen der Nieren und/oder Hartrakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorgeschichte*	Ja	Nein
Harnwegsinfekte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorangegangene erfolglose Therapieversuche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stuhlgang**	Ja	Nein
Verstopfung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stuhlspuren in der Unterwäsche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinkverhalten***	Ja	Nein
Trinkt das Kind abends/nachts übermäßig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Psychologie**	Ja	Nein
Verhaltensauffälligkeiten oder andere psychologische Probleme evident (z.B. ADHS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Hinweise auf dyskoordinierte Blasenentleerung

**Risiko für Therapieversagen

***Risiko für Nebenwirkungen bei medikamentöser Therapie