

E D H - Enuresis Diagnose Hilfe

Enuresis nocturna	Ja	Nein
Nässt Ihr Kind in der Nacht ein?		
Alter > oder = 5 Jahre		

Warnzeichen
Falls die Antwort auf auch nur eine einzige der folgenden Fragen „JA“ ist, liegt möglicherweise keine simple „monosymptomatische Enuresis“ vor und eine weiterführende Diagnostik ist unbedingt indiziert!

Urologische Symptome*	Ja	Nein
Harnverlust tagsüber?		
Miktionsfrequenz/Tag > 8x		
Miktionsfrequenz/Tag < 3x		
Imperativer Harndrang?		
Elterliches Drängen zur Miktion notwendig?		
Portionsweises Urinieren?		
Begleiterkrankungen der Nieren und/oder Harntrakt		
Vorgeschichte*	Ja	Nein
Harnwegsinfekte?		
Vorangegangene erfolglose Therapieversuche		
Stuhlgang**	Ja	Nein
Verstopfung?		
Stuhlspuren in der Unterwäsche?		
Trinkverhalten***	Ja	Nein
Trinkt das Kind abends/nachts übermäßig		
Psychologie**	Ja	Nein
Verhaltensauffälligkeiten oder andere psychologische Probleme evident (z.B. ADHS)?		

*	Hinweise auf dyskoordinierte Blasenentleerung
**	Risiko für Therapieversagen
***	Risiko für Nebenwirkungen bei medikamentöser Therapie